



香港兒童免疫過敏及傳染病學會

The Hong Kong Society for Paediatric Immunology, Allergy and Infectious Diseases



香港兒童及青少年皮膚科學會
Hong Kong Paediatric and
Adolescent Dermatology Society



香港兒科醫學會
The Hong Kong
Paediatric Society



香港兒科護理學院
Hong Kong College of
Paediatric Nursing



香港兒科護士學會
Hong Kong Paediatric
Nurses Association

香港兒童免疫過敏及傳染病學會、香港兒科醫學會、香港兒童及青少年皮膚科學會、
香港兒科護理學院、香港兒科護士學會有關

兒童和青少年過敏症接種新冠疫苗建議之聯合聲明

最新的臨床研究發現，新冠疫苗對六個月至十七歲的兒童和青少年接種者是安全且高效的。接種新冠疫苗對預防嚴重急性疾病、死亡和中、長期後遺症的個人和社會益處遠超過對新冠疫苗產生嚴重過敏反應的風險。

以下情況並不是接種新冠疫苗的禁忌症，在接種新冠疫苗之前不需要轉介給兒童免疫過敏及傳染病學專科醫生進行評估：

- 一、對新冠疫苗或其成分沒有相關連的過敏史，例如：
 - i. 沒有相關連的疫苗或藥物；
 - ii. 食物過敏；
 - iii. 昆蟲毒液；
 - iv. 吸入性過敏原（例如：塵蟎、花粉、動物皮屑、黴菌）；
- 二、哮喘
- 三、鼻敏感
- 四、濕疹
- 五、慢性自發性蕁麻疹 (Chronic spontaneous urticaria)

我們建議以下接種者在接種疫苗後需要三十分鐘的觀察期：

1. 對不同類型的新冠疫苗曾經有過敏反應的兒童（例如，對復必泰疫苗有過敏的人應在接種科興疫苗後觀察三十分鐘）；
2. 有對新冠疫苗或其成分無關的藥物或疫苗過敏史的兒童；
3. 因任何原因有嚴重過敏反應(Anaphylaxis)史的兒童；
4. 肥大細胞增多症 (Mastocytosis).

接種新冠疫苗的醫生應做好準備，儘早識別過敏反應的體徵和症狀，及時處理此類過敏反應，並在繼續照顧患者的同時啟動進一步的緊急醫療服務。

二零二二年八月十二日